

# HaFCED

Hamburgisches Forschungsinstitut für  
chronisch entzündliche Darmerkrankungen

Indikation	Status	Phase	Behandlungswochen
MorbusCrohn	aktiv	3	100 Wochen
Colitis Ulcerosa	aktiv	OL	240 Wochen
mittel bis hochaktiver MorbusCrohn ,TNF alpha naiv	aktiv	OL	12 Wochen
Morbus Crohn +Neustart Humira	aktiv	AWB	24 Monate
Colitis Ulcerosa	aktiv	2b	4 Jahre
Morbus Crohn nach OP	aktiv	3b	208 Wochen
Morbus Crohn	2013	3	54 Wochen
mittel bis hochaktiver MorbusCrohn ,TNF alpha	aktiv	3	12Wochen
Morbus Crohn	aktiv	3	18 Wochen
Morbus Crohn	aktiv	3	18 Wochen
Morbus Crohn	aktiv	2	12 Wochen
Morbus Crohn	aktiv	AWB	76Monate
Colitis Ulcerosa	aktiv	AWB	
Colitis Ulcerosa	aktiv	AWB	
Morbus Crohn	aktiv	AWB	
Morbus Crohn TNF alpha Resistenz oder Intoleranz	aktiv	induktion 3	8 Wochen
Morbus Crohn,TNF alpha naiv	aktiv	induktion 3	8 Wochen
Morbus Crohn	aktiv	roll over 3	46 Wochen
Morbus Crohn +Eisenmangel	aktiv	3	64
Colitis Ulcerosa +Eisenmangel	aktiv	3	64
Morbus Crohn	aktiv	2	28 Wo +
Morbus Crohn +Gallensäureverlustsyndrom	aktiv	3	4 wo

